

ارتباط خميره المبيضة البيضاء والغير البيضاء بالالتهاب المهبلي بين النساء الحوامل والغير الحوامل في مدينة صنعاء

اجرت طالبة الماجستير سميرة محمد مهدي الحطامي دراسة للتقصي عن انتشار داء المبيضات بين الحوامل والغير الحوامل المترددات على عيادة النساء والولادة في مركز العلفي للامومة والطفولة والمركز الوطني للمختبرات الصحة العامة المركزية في مدينة صنعاء للفترة من مايو 2011 الى مارس 2012. وكانت هذه الدراسة باشراف كلا من د. ضياء عبدالحفيظ الدناني و أ.د حسن الشماحي.

شملت الدراسة عدد 190 امراه منهم 95 امراه حامل و95 امراه غير حامل تراوحت أعمارهن بين 20-35 سنة

هدفت الدراسة الى معرفة معدل انتشار المبيضات البيضاء والغير البيضاء في النساء الحوامل والغير الحوامل في مدينة صنعاء, تحديد عوامل الاخطار للاصابة المرتبطة بالمبيضات و غير البيضاء.

حيث تم اخذ مسحة من المهبل لجميع النساء الحوامل وتم زراعتها في المختبر وكانت النتائج على النحو التالي :
وجد ان نسبة انتشار المبيضات بين النساء الحوامل 51.6% ونسبة انتشارها بين النساء الغير الحوامل كانت 22.1%

وكانت اكثر الانواع انتشارا المبيضة البيضاء *Candida albicans*

حيث كانت نسبة 45.3% من مجموع المعزولات كليا في النساء الحوامل ونسبة انتشارها في غير الحوامل كانت 17.9%

تلاها نوع المبيضة الغير البيضاء *Candida glabrata*

بنسبة 3.1% ثم بقية انواع المبيضات الغير البيضاء بنسبة 1.1%.

وايضا وجد ان هناك علاقة احصائية ملحوظة بين ارتفاع معدل الاصابات في النساء الحوامل والعوامل مثلا الاتصال الجنسي ونوع الملابس الداخلية, طريقة النظافة المستخدمة بعد الحمام (من الامام الى الخلف) بينما

في النساء الغير الحوامل لم يكن هناك أي علاقه احصائية ملحوظه ماعدا طريقة النظافة المستخدمة في الحمام كانت لها دلالة احصائية.

ولم يلاحظ وجود أي دلالة احصائية ملحوظه بين معدلات الاصابات وبعض العوامل الاخرى مثل مرحلة الحمل , الاصابة بداء السكري, استخدام الحوامل للمضادات الحيوية , مثبطات المناعه كالاستيرويدات بينما بعض الاعراض المشاهدة كان لها دلالة احصائية ملحوظه مع المرض مثل الحكه المهبليه والافرازات المهبليه لكن الاعراض الاخرى مثل الحرقه لم يكن لها دلالة احصائية مع المرض.

وتوصي الدراسة بالاهتمام بالنظافة الشخصية.